

Agathomyia Wankowiczii Schnabl und aurantiaca Bezzi nebst einer Übersicht der europ. Agathomyia-Arten (Dipt.).

Von P. Leander Czerny in Kremsmünster, Oberösterreich.

Dr. J. Schnabl beschrieb im Pamiętnik Fizyograf. 1884, pag. 293 (Warschau) unter dem Namen *Callomyia Wankowiczii* ♀ eine aus dem Gouvernement Mohilew stammende, durch ihre orangegelbe Färbung von allen bis dahin bekannten *Callomyia*-Arten¹⁾ verschiedene Art, deren lateinische Diagnose — die Charakteristik ist polnisch gegeben — lautet: »Aurantiaca, antennis, scutello, halteribusque concoloribus; alis flavescentibus«.

Neun Jahre später beschrieb Prof. Dr. M. Bezzi in dieser Zeitung, Jahrg. XII, 1903, pag. 304 unter dem Namen *Callomyia aurantiaca* ein auf dem Monte Baldo bei Mori gefangenes Männchen, dessen Diagnose lautet: »Aurantiaca, capite, thoracis lateribus, pectore, metanoto ultimoque abdominis segmento atris; antennis pedibusque luteis, illis articulo tertio subulato; alis hyalinis, nervis, costa excepta, lutescentibus. Long. 3 mm (exsiccata)«.

Diese beiden Arten wurden von Fr. Hendel in dieser Zeitung Jahrg. XXI, 1902, pag. 265, Nr. 23, für eine Art erklärt.

Prof. Bezzi erwiderte im Jahrg. XXII, 1903, pag. 21 und 22 dieser Zeitung auf die von Hendel aufgestellte Synonymie, indem er den Unterschied beider Arten in der Körper- und Flügelfärbung hervorhob, der nicht bloß vom Geschlechte herkommen könnte, gab aber die Wahrscheinlichkeit der Synonymie zu. Zugleich teilte er mit, daß bei der Schnabl'schen Art ebenso wie bei seiner das dritte Fühlerglied verlängert und die erste Längsader nicht beborstet sei und daher beide Arten zu der Verrall'schen Gattung *Agathomyia* gehörten.

Ich bin nun in der angenehmen Lage erklären zu können, daß die Bezzische Art mit der Schnabl'schen nicht identisch ist. Am 17. Juni d. J. fing ich in der Nähe von Kremsmünster bei Kremsursprung ein *Agathomyia*-Männchen, das zweifelsohne die *A. Wankowiczii* ist.

Da die polnische Beschreibung der *Agathomyia Wankowiczii* nur wenigen Dipterologen verständlich sein dürfte, so lasse ich eine Beschreibung meines Männchens folgen.

¹⁾ *Callomyia*, em. Verrall, British Flies, Vol. VIII, 1901, p. 24.

Das ganze Tier ist orangegebl, nur die Stirn, das Gesicht, die Backen, der Scheitel, der Hinterkopf und der hintere Teil des eingeschlagenen Hypopygs sind schwarz. Die Postokulareilien sind orangegebl, die oberen scheinen schwarz zu sein, schimmern aber in gewisser Richtung orangegebl. Die Augenfacetten der oberen Halfte sind groer als die der unteren. Das zweite Fuhlerglied tragt oben eine gelbe Borste, das dritte ist nicht so lang ausgezogen wie bei *antennata* Ztt., es ist ungefaher nur zweimal so lang als breit; die Fuhlerborste erscheint in gewisser Richtung dunkel und ist mehr als zweimal so lang als das dritte Fuhlerglied. Beborstung des Thorax: eine Reihe sehr kleiner, weit vor dem Vorder- und Hinterrande aufgehorender Akrostichalborsten, eine hintere Dorsocentralborste und von dieser aus eine vorn zu den Schultern abbiegende Reihe kleiner Borsten, zwei Supraalarborsten, funf in schiefer Reihe stehende Praalarborsten, acht Skutellarborsten, zwei langere an der Spitze und je drei kurzere an den Seiten. Alle diese Borsten sind schwarz. Beine: Vordersehenkel auf der Ruckseite unten, nahe der Basis mit dem gewohnlichen gebogenen Dorne, Vorderschienen nahe an der Spitze mit einer spornartigen Borste; Mittelschenkel auf der Vorderseite zwischen der Mitte und der Spitze mit einer kleinen Schwiele, Mittelschienen im Wurzel-drittel mit einer Borste und an der Spitze innen mit einem Sporne, Metatarsus der Mittelbeine mit zwei Borsten, von denen die kurzere ganz nahe an der Basis, die langere etwas entfernter davon steht; Hinterschenkel ruckwarts auf der Unterseite nahe an der Basis mit einer starken Borste, oben mit einer Borstenreihe, Metatarsus der Hinterbeine mit einer kleinen Borste unten nahe an der Wurzel. Alle diese Dorne und Borsten sind braunlich orangegebl. Flugel irisierend, gelb, die Adern starker gelb, die hintere Querader unten schief nach auen gestellt. Schuppehen schwarz gerandet und schwarz gewimpert. Borsten des Hinterleibes sehr sparlich, kurz und schwarz, vorn an den Seiten einige gelbe Borsten.

Übersicht der europaischen Agathomyia-Arten.¹⁾

A. Mannchen.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Thorax ganz oder zum Teil orangegebl | 2 |
| Thorax schwarz oder grau | 3 |
| 2. Thorax ganz orangegebl | <i>Wankowiczii</i> Schnabl |

¹⁾ Nach Verralls Catalogue of the *Platypesidae* of the European District 1900, pag. 4 und 5 ist *A. Megerlei* Mg. synonym mit *Falleni* Ztt., *cinerea* Ztt. und *Hoffmanseggii* Mg. mit *antennata* Ztt. — Ich kenne nur *antennata* Ztt. ♂, *Falleni* Ztt. ♀ und *Wankowiczii* Schnabl ♂, alle drei aus hiesiger Gegend.

- Thorax vorn, an den Seiten, auf der Brust
und am Hinterrücken schwarz . . . *aurantiaca* Bezzi
3. Thorax dunkelgrau, Hinterleib gelb, mit
braunen Flecken *Falléni* Ztt.
- Thorax und Hinterleib schwarz 4
4. Mittelschienen im Wurzeldrittel mit einer
Borste, Metatarsus der Mittelbeine mit
einer oder zwei Borsten ganz nahe an
der Wurzel *antennata* Ztt.
- Mittelschienen ohne Borste, Metatarsus der
Mittelbeine mit einer Borste im Wurzel-
drittel *Collini* Verr.

B. Weibchen:

1. Thorax orangegebl *Wankowiczii* Schnabl
Thorax schwarz oder grau 2
2. Hinterleib zum Teile orangegebl oder braun,
mit gelben Hinterrandsäumen 3
Hinterleib anders gefärbt 4
3. Die ersten drei Segmente des Hinterleibes
und das vierte mit Ausnahme eines schwar-
zen Seitenfleckes orangegebl *Zetterstedti* Whlbg.
Hinterleib braun, mit gelben Hinterrand-
säumen *Falléni* Ztt.
4. Hinterleib ganz schwarz *viduella* Ztt.
Hinterleib nicht ganz schwarz 5
5. Erstes und zweites Segment des Hinter-
leibes an den Seiten und die beiden
letzten Segmente silberfarbig, drittes bis
fünftes Segment schwarz *Collini* Verr.
Hinterleib schwarz, mit grauen Flecken auf
dem Rücken des ersten und zweiten und
zum Teile des dritten Segmentes oder
fast alle vier Basalsegmente grau, mit
dreieckigen schwarzen Rückenflecken . . . *antennata* Ztt.